

Übungsblatt 10

Aufgabe P1 *Fischpopulation.*

In einem Teich befinden sich n Fische, wobei n (die Populationsgröße) unbekannt sei. Um die Populationsgröße n zu schätzen, kann man wie folgt vorgehen. Im ersten Schritt werden aus dem Teich n_1 (eine bekannte Zahl, kleinergleich n) verschiedene Fische gefangen und markiert. Danach werden die n_1 Fische wieder in den Teich zurückgeworfen. Im zweiten Schritt werden x (eine bekannte Zahl, kleinergleich n) verschiedene Fische gefangen. Unter diesen x Fischen ist eine Anzahl an Fischen markiert, diese Anzahl nennen wir $x_1 \in \{0, \dots, x\}$. Entsprechend sind als $x - x_1$ der im zweiten Schritt gefangenen Fische nicht markiert.

Bestimmen Sie den Maximum-Likelihood-Schätzwert für die Populationsgröße n .

Aufgabe P2 *Körpergröße.*

Die Körpergröße von Menschen kann als normalverteilt angenommen werden. Sie vermessen 20 Männer und erhalten die folgenden Körpergrößen in cm

185, 176, 152, 178, 181, 194, 163, 168, 171, 179,
181, 175, 164, 202, 176, 181, 180, 174, 178, 182.

Bestimmen Sie Konfidenzintervalle für den Erwartungswert und die Varianz der Körpergröße von Männern, die die gesuchten Parameter mit einer Wahrscheinlichkeit von 95% enthalten.

Hinweis: Verwenden Sie ohne Beweis

$$(n-1)S^2 = \left(\sum_{i=1}^n X_i^2 \right) - n\bar{X}^2$$

wobei $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$.

Aufgabe H1 *Konfidenzintervall für Exponentialverteilung.*

Seien X_1, \dots, X_n , $n \in \mathbb{N}$, unabhängig und identisch verteilt mit $X_1 \sim \text{Exp}(\lambda)$ und $\lambda > 0$ sei der unbekannte zu schätzende Parameter. Das heißt, X_1 hat die Dichte $f_\lambda(x) = \lambda e^{-\lambda x} 1_{\{x>0\}}$. Weiterhin seien $X_{(1)} := \min\{X_1, \dots, X_n\}$ das Minimum der Daten und $\alpha \in (0, 1)$. Zeigen Sie, dass

$$K := \left[-\frac{\ln(1 - \frac{\alpha}{2})}{nX_{(1)}}, -\frac{\ln(\frac{\alpha}{2})}{nX_{(1)}} \right]$$

ein Konfidenzintervall zum Konfidenzniveau $1 - \alpha$ für λ ist.

Aufgabe H2 *Wahlbeteiligung.*

Die Fachschaft möchte vor den Hochschulwahlen die voraussichtliche Wahlbeteiligung schätzen. Auf dem Weg zur der Mensa befragt jeder der Mitarbeiter solange Studenten, bis er jemanden trifft, der angibt, nicht zur Wahl zu gehen.

X bezeichne die Anzahl der Studenten, die überprüft wurden, bis ein potentieller Nichtwähler gefunden wurde. Eine sinnvolle Verteilung für X ist beispielsweise die modifizierte geometrische Verteilung mit dem Parameter $1 - \theta$, das heißt

$$\mathbb{P}_\theta(X = i) = \theta^{i-1} \cdot (1 - \theta), \quad i \in \mathbb{N}.$$

Die unbekannte Größe $\theta \in (0, 1)$ kann dabei als die gesuchte prozentuale Wahlbeteiligung interpretiert werden.

- a) Bestimmen Sie für unabhängige Stichproben x_1, \dots, x_n den Maximum-Likelihood-Schätzwert für θ .
- b) Nun haben Sie folgende konkrete Stichprobenwerte gegeben

$$3, \quad 1, \quad 2, \quad 3, \quad 2, \quad 1, \quad 2, \quad 1, \quad 5, \quad 3, \quad 2, \quad 3.$$

Berechnen Sie für diese Werte den Maximum-Likelihood-Schätzwert für θ .

Aufgabe H3 *Konfidenzintervalle.*

In einem Online-Shop wird festgestellt, dass von $n = 100$ überprüften Benutzern genau $H = 80$ Benutzer einen Webbrowser verwenden, der nicht über alle von den Webdesignern des Shops gewünschten Fähigkeiten verfügt. Es soll ein Konfidenzintervall für den relativen Anteil der Benutzer mit veraltetem Browser bestimmt werden, dass höchstens mit Wahrscheinlichkeit $\alpha = 0,05$ nicht eingehalten wird.

- a) Bestimmen Sie das Konfidenzintervall approximativ unter Verwendung der Quantile der Normalverteilung.
- b) Es stellt sich heraus, dass die Stichprobenvarianz 0,16 beträgt. Bestimmen Sie das Konfidenzintervall unter Verwendung der Quantile der t -Verteilung.

Abgabe der Hausübungen (Aufgaben H1 bis H3): **Mittwoch, 12. Januar, 13:00 Uhr**

Viel Erfolg! :)